



ریتالین

- ✓ متیل فنیدیت (mph) با نام تجاری "ریتالین" توسط کمپانی داروسازی نوارتین در سال ۱۹۵۴ به بازار دارویی دنیا عرضه شد.
- ✓ ابتدا قرار بود این دارو برای درمان افسردگی، خواب الودگی در طول روز و سندرم خستگی مزمن استفاده شود بایشرفت علم از این دارو برای درمان اختلال بیش فعالی و کم توجهی کودکان استفاده گردید.
- ✓ ریتالین خواصی شبیه امفتامین (همان قرص اکستاسی) دارد و عوارض مصرف خودسرانه آن در حد مواد مخدر دیگر نظیر کوکائین و امفتامین است.
- ✓ ریتالین واکنش های روانی همچون توهم، سوء ظن، جنون، فقدان بصیرت، هذیان و افکار آشفتگی و پریشان را بدنبال دارد.
- ✓ در سال ۲۰۰۳ مطالعه ای روی دانشجویان سال اول یکی از دانشگاه های بزرگ امریکا انجام شد. معلوم گردید ۱۴ درصد آنها حداقل یکبار برای دلایل غیر پزشکی از این داروی محرک استفاده کرده اند و نکته جالب اینکه نمرات این افراد نسبت به کسانی که از ریتالین استفاده نکرده بودند کمتر بوده است.
- ✓ برخلاف تفکر غلط، التهاب در عروق مغز و خطر سکته مغزی از عوارض مهم این مواد است.
- ✓ اختلال در خواب، افسردگی، انزوا، و عدم لذت از زندگی عوارض درازمدت استفاده از ریتالین است.
- ✓ ریتالین زمینه ساز گرایش به مصرف مواد مخدر صنعتی محسوب میشود.